

**BORO AGRÍCOLA 15%****PROMOTOR DE CITOQUININAS****TRANSPORTADOR DE AZÚCARES – CORRECTOR DE DEFICIENCIA DE BORO****CARACTERÍSTICAS:**

BOROWIN es un fertilizante líquido de alta concentración de Boro indicado para prevenir y corregir las deficiencias de este importante micronutriente en la planta y de esta manera evitar síntomas de carencia como agrietamiento de frutos y peciolo, hojas pequeñas y quebradizas, acorchado de frutos, etc.

BOROWIN que gracias a su formulación a base de boro etanolamina, presenta todas las ventajas de este agente complejante: coadyuvante que facilita la absorción del Boro por las hojas y su penetración en la planta. El elemento Boro está involucrado directamente en el transporte de azúcares a través de las membranas, estimula el crecimiento de los meristemos apicales, favorece el cuajado de frutos.

BENEFICIOS DE USO:

- **BOROWIN** mejora la floración, la fecundación y el cuajado del fruto.
- **BOROWIN** refuerza la calidad y la capacidad de conservación del fruto.
- **BOROWIN** estimula el crecimiento de los meristemos, el centro de la división celular.
- **BOROWIN** mejora el rendimiento en azúcar gracias al aumento de la sacarosa.
- **BOROWIN** facilita la translocación de azúcares y almidón a los órganos de reserva.
- **BOROWIN** aumenta la resistencia a plagas y enfermedades.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Boro (B)..... 15%
Derivado de Boro Etanolamina

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Estado físico: Líquido
- Color: Marrón
- Olor: Característico al producto
- Densidad: 1.35 Kg/L
- pH: 6 – 6.5
- Solubilidad en agua: 100%

CUADRO DE DOSIFICACIÓN Y USOS:

CULTIVO	DOSIS L/200L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa	0.25 - 0.50	1° Al inicio de floración. 2° En llenado de tubérculos.
Algodón	0.25 - 0.50	1° Al inicio de botoneo. 2° Después de 15 días.
Arroz	0.25 - 0.50	1° Aplicar al inicio del "punto de algodón". 2° Repetir durante el espigado.
Tomate	0.25 - 0.50	1° Al inicio de floración. 2° Repetir a los 15 días.
Granadilla	0.25 - 0.50	1° Al inicio de formación de botones florales. 2° Durante el llenado de frutos.
Café, Cacao	0.25 - 0.50	1° Inicio de floración. 2° Llenado de frutos.
Brócoli, Col	0.25 - 0.50	1° Cuando tenga 6 - 8 hojas. 2° Repetir luego de 20 días.
Palto, Olivo	0.25 - 0.50	1° Inicio de floración. 2° repetir a los 20 días.
Cucurbitáceas	0.25 - 0.50	1° Al inicio de floración. 2° Repetir a los 15 días.
Flores	0.25 - 0.50	1° Al inicio de rebrote de hojas. 2° repetir a los 20 días.
Papaya	0.25 - 0.50	1° Inicio de floración. 2° Repetir a los 20 días.
Palma aceitera	0.25 - 0.50	1° Inicio de floración. 2° Repetir a los 20 días.

PRESENTACIONES:

1 L – 5 L – 20 L – 200 L

FICHA TÉCNICA
Actualización: Ago. 2024
APROBADO