

WINNER FOL

HIERRO

**MEJORADOR DE LA SINTESIS DE CLOROFILA
CORRECTOR DE DEFICIENCIA DE HIERRO**

CARACTERÍSTICAS:

WINNER FOL HIERRO es un producto a base de Hierro enriquecido con Zinc y Manganese quelatados con aminoácidos, además contiene lignosulfonatos lo que incrementa la movilidad del Hierro dentro de la planta. Su formulación permite la aplicación vía foliar y al suelo, recomendado para el tratamiento preventivo y curativo de las deficiencias de Hierro (clorosis) en hortalizas y frutales.

WINNER FOL HIERRO aporta el elemento Hierro muy esencial para el crecimiento de las plantas, juega un rol muy importante como activador de muchos procesos bioquímicos enzimáticos, influye en el contenido de clorofila, está asociado a la síntesis de las proteínas, los tres componentes (Fe, Zn, Mn) influyen positivamente en el proceso de fotosíntesis, respiración y producción de hormonas.

BENEFICIOS DE USO:

- **WINNER FOL HIERRO** corrige y/o previene las deficiencias de Hierro (clorosis) en cualquier cultivo.
- **WINNER FOL HIERRO** aumenta la tasa fotosintética de la planta obteniendo una mayor y mejor calidad de productos.
- **WINNER FOL HIERRO** brinda mayor tolerancia a los cultivos contra enfermedades.
- **WINNER FOL HIERRO** fomenta el crecimiento vigoroso de las plantas.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Hierro (Fe).....	5%
Zinc (Zn).....	2%
Manganeso (Mn).....	2%
Aminoácidos libres.....	3%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Estado físico: Líquido viscoso
- Color: Marrón oscuro
- Olor: Característico al producto
- Densidad: 1.35 Kg/L
- pH: 4 – 4.5
- Solubilidad en agua: 100%

CUADRO DE DOSIFICACIÓN Y USOS:

CULTIVO	DOSIS L/200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Naranja, Mandarina, Tangelo, Limón	0.5 - 1	1° Antes de floración. 2° Luego del cuajado de frutos.
Palto, Mango, Fresa	0.5 - 1	1° Antes de floración. 2° Luego del cuajado de frutos.
Manzano, Durazno, Pera	0.5 - 1	1° Luego del cuajado. 2° En llenado de frutos.
Café, Cacao	0.5 - 1	1° Antes de floración. 2° Luego del cuajado de frutos.
Vid	0.5 - 1	1° Antes de floración. 2° Luego del cuajado de frutos.
Arándano	0.5 - 1	1° Antes de floración. 2° Luego del cuajado de frutos.
Papa	0.3 - 0.5	1° A la emergencia. 2° Inicio de tuberización.
Arroz	0.3 - 0.5	1° Al macollaje. 2° En grano lechoso.
Frijol, Pallar, Haba, Arveja, Maní.	0.3 - 0.5	1° Antes de la Floración. 2° Luego del cuajado de vainas.
Cebolla, Ajo, Poro.	0.3 - 0.5	1° 30 días luego del trasplante. 2° Al inicio del engrosamiento del bulbo.
Tomate, Pimiento, Ají, Paprika.	0.3 - 0.5	1° Al crecimiento y desarrollo vegetativo. 2° Después del cuajado de frutos.
Zapallo, Sandía, Melón.	0.3 - 0.5	1° Después del "capado". 2° Después del cuajado de frutos.
Brócoli, Apio, Col, Espinaca, Lechuga.	0.3 - 0.5	1° 20 días después del trasplante. 2° Repetir luego de 20 días.

ADVERTENCIA:

- Utilizar solamente en caso de necesidad constatada.
- Utilizar solo de la forma recomendada en la etiqueta.
- No sobrepasar la dosis indicada (a mayor tamaño o edad de la planta corresponde mayor dosis).
- El usuario es responsable por los daños causados por el mal uso del producto.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Iniciar las aplicaciones en forma preventiva al inicio de campaña cuando se espera una deficiencia de Hierro o en los primeros síntomas, comenzando por la dosis más baja.
- Incluso si reducimos la clorosis férrica con una sola aplicación, recomendamos una segunda aplicación 15 -20 días después de la primera.
- Aplicación foliar según la edad y el área foliar de la planta.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

WINNER FOL HIERRO se aplica normalmente vía foliar, a través de aspersión, pero por su formulación especial también es posible aplicar vía radicular a través de riego tecnificado.

COMPATIBILIDAD:

WINNER FOL HIERRO es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas de uso agrícola a **excepción** de productos de fuerte reacción alcalina, no mezclar con calcio, así como fertilizantes fosfatados, cúpricos, y aceites minerales.

PRESENTACIONES:

1 L - 5 L – 20 L – 200 L

FICHA TÉCNICA

Actualización: Ago. 2024

APROBADO